

*：2007年4月改訂（第1版）

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なき詰めるよう保管してください。

漢方・生薬製剤

ホンノー錠

医薬品

ホンノー錠は、9種の和漢薬を服用しやすいように錠剤にしたもので、打撲・骨折・捻挫により生じた内出血及び炎症を消散します。

負傷後、ホンノー錠を服用すると内出血及び諸症状（熱、はれ、痛み、黒いあざ等）を改善します。



使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | はげしい腹痛、下痢 |

【用法・用量】

大人1日3回、毎食間、水または白湯にて服用。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日服用回数 |
|-------------|---------|---------|
| 大 人 (15歳以上) | 10 錠 | 3 回 |
| 7歳以上 15歳未満 | 5 錠 | |
| 5歳以上 7歳未満 | 3 錠 | |
| 5歳未満の乳幼児 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関する注意〉

- 定められた用法、用量を厳守すること。
- 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 1日量（8.0g）中

| | | | |
|----------|------|----------------------------------|------|
| 日局オウバク末 | 0.3g | 日局シャクヤク末 | 0.8g |
| 日局ブクリョウ末 | 0.8g | 日局ダイオウ末 | 0.7g |
| 日局ソウジュツ末 | 0.9g | 日局トウキ末 | 0.9g |
| 日局カンゾウ末 | 0.8g | 日局センキュウ末 | 1.0g |
| 日局シユクシヤ末 | 0.8g | 添加物として、水酸化アルミニウム、 カルメルスを含有する。 | |

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

【消費者相談窓口】


本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 ホンノー薬品株式会社

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-41-0317

営業時間 9:00～17:00（月～土曜日）

ホームページ <http://www.urban.ne.jp/home/honnoo/index.htm>

製造販売元  **ホンノー薬品株式会社**
山口県岩国市岩国1-13-12

【効 能】

打撲・骨折・捻挫による内出血及び炎症を消散する。

